


REINETTE EISEN (12.03)-J-G-

Fichier choisel 2000-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel.

ORIGINE : Wurtemberg aux environs de Tübingen dans la vallée de Reutlingen, contrées visitées au 16^e siècle par Jean Bauhin botaniste Montbéliardais. Exposée en 1867, par les allemands à Paris. Greffons envoyés à A.Leroy d'Angers, en mars 1870, par le superintendant Oberdieck de Jeinsen, près d'Hanovre.

SYNONYMES : Kirch (Lucas, "die Kernobstsorten Württemberg", 1854, p.91).- Rother Tiefbutzer (d°).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Moyenne ou moins, L=58mm., H=56mm.- Plus large mais cylindrique, parfois un peu conique, aplatie côté pédoncule, asymétrique.

EPIDERME : Rugueux, blanc jaunâtre nuancé de vert, avec légères vergetures rosées côté insolation. Lenticelles grises très fines.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, assez profonde, rousse.

PEDONCULE : Grosseur moyenne, court à très court, se situe à mi hauteur de cuvette. Arqué, oblique.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu large, profondeur variable, unie, marbrée de roux.

ŒIL : Moyen, mi clos.

CHAIR : Un peu verdâtre, fine, compacte, ferme, juteuse, sucrée, savoureusement acidulée et parfumée. Première qualité.

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux à rameaux érigés ou un peu étalés à petites lenticelles clairsemées. Yeux petits, aux écailles cotonneuses et mal soudées, faiblement écartés de l'écorce. Feuilles petites, irrégulièrement dentelées à petit pétiole grêle mais rigide de moyenne longueur.

REFERENCES :choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°397 (silhouette ici).