

REINETTE FRANCHE

© choisel jean-louis-2001-2013



W.Lauche Deutsche Pomologie 1882/83.



R.Stoll 1888 Pomologie.


ORIGINE : Avant 1540 en Normandie. Première mention du terme "Reinette" par Charles Estienne, en 1540, pour désigner notre variété, puis en avril 1543 dans les comptes de l'abbaye St Amand de Rouen " pommes de Raynette".

Décrite par Sté Pomologique de France: "Catalogue descriptif", 1927, p.426, "Le Verger Français", 1947, p.419.- Par Vercier, p.229, 1934.- Présente à Brogdale ("the Book of Apples", 1993, p.252).

Décrite et gravure couleurs par W.Lauche, "Deutsche pomologie", 1882/83, n°85,- et par Mas "Le Verger", 1868, t.4, n°28, - et présente dans le catalogue Pinguet Guindon de Tours en 1936, et dans celui des pépinières Leroy, Angers ,en 1916 et 1935.

SYNONYMES : De renette (Charles Estienne, "Seminarium et plantarium fructiferarum...solent", 1540, p.54- et Meyer, "Pomona franconica", 1776, t.3, p.136, n°46).- Reinette (Olivier de Serres, "Le Théâtre d'agriculture et ménage des champs", éd.1608, p.626).- Reinette Blonde (à tort, en 1678 et 1862 par Claude Mollet puis par Eugène Forney).- Reinette Blanche (la Quintinye, "Instructions pour les jardins fruitiers et potagers", 1690, t.1, p.389-et Herman Knoop, "Pomologie", 1740, pl.8, p.11(gravure ici), et 1771, éd.française, p.53- et Manger,"Systematische Pomologie", 1780, p.24, n°6, puis p.36, n°XLIV- et Robert Hogg, " the Apple and its varieties", 1859, p.168).- Reinette commune(Saussay, "traité des jardins", 1722, p.142).- Reinette Triomphante (Herman Knoop, déjà cité, et pp.48 et 132 de 1771).- Edelreinette (Diel, "Kernobstsorten", 1799, t.1, p.120).- Reinette de Clareval (d°, 1816, t.12, p.111).- Reinette Von Clareval (baron de biedenfeld, "Handbuch aller bekannten Obstsorten", 1854, é° partie, p.189).- Victorious reinette (Elliott, "Fruit book", 1854, p.179).- Reinette Franche Rose (André Leroy, "Catalogue descriptif et raisonné des arbres fruitiers et d'ornement", Angers, 1855, p.43, n°195).- Goldreinette (C.A. Hennau, "Annales de pomologie belge et étrangère", 1856, p.65, t. 4, et réédition 1998, p.445/46/48).- Reinette de Normandie (Robert Hogg, 1859, p.168- et Charles Downing, "the Fruits and fruit trees of America, 1869, p.184).-

Il semble y avoir confusion, chez certains amateurs, avec Reinette Piquée(synonyme de Raffray ou Pied de Biche, et, également, selon Leroy, synonyme de Grosse Reinette de Cassel)(j'ai trouvé des exemplaires, ma photo, en 1985, chez René Lemasson, le Clos St Pierre-35530, Noyal/Vilaine, sous le nom de Reinette Blanche et reinette Piquée).
MATURITE-CONSOMMATION : Décembre—avril-Mai.



FORME : Moyenne ou plus. Leroy ,qui la dit très inconstante, distingue 4 types dont 3 se ressemblent en forme cônique-arrondie, et un type cylindrique(silhouette ici en haut). Toutes sont plus larges que hautes. Souvent pentagone ou côtelée mais, parfois, dépourvue de gibbosités côté cuvette de l'oeil.

EPIDERME : Epais, uni ou un peu rugueux, jaune pâle côté ombre, jaune brunâtre à l'insolation ou, parfois il est finement lavé de rose, donnant un teint doré. Lenticelles nombreuses remarquables, grises ou brunes cerclées de blanc, et, souvent, formant étoiles.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite à large, assez profonde, roux verdâtre.


PEDONCULE : Moyen à gros, court à long, dépasse souvent ou non, plus gros à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL : Large, évasée, de profondeur variable, plissée, bossuée, souvent réticulée de fauve dans le voisinage de l'oeil.

ŒIL : Grand à moyen (5 à 6mm.), mi clos ou clos.

CHAIR : Blanc jaunâtre("Annales de pomologie...= blanche), fine, croquante, assez ferme, juteuse à bien juteuse, très sucrée, et bien acidulée("Annales de pomologie...= peu acidulée)(celle que j'ai observé en 1985 avait, au 10 mars, une bonne saveur sucrée-acidulée équilibrée, avec légère saveur de Reinette Grise), à parfum délicieux. Première qualité.

LOGES à PEPINS : Hautes, closes, à peine fendillées (mes observations, voir ma coupe) ou bien feutrées (Lauche mais à tort). Etroites("Annales de pomologie...), large (Lauche).En tous



cas pas lisse.

.Selon Oberdieck

OBSERVATIONS : Arbre assez vigoureux aux nombreux rameaux érigés, gros, très longs, bien duveteux aux grandes lenticelles très apparentes et nombreuses. Yeux gros, cotonneux, collés contre l'écorce. Feuilles grandes, largement et profondément dentelées à gros pétiole de moyenne longueur. Fertilité normale.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE: .- "Annales de pomologie belge et étrangère A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°401(silhouette) .- Knoop, 1740, vue en haut à gauche.- Photo et coupe Choisel2001 Silhouette Sté Pomologique de France, 1927.- En bas; gravure de l'abbé Rozier, 18^e siècle. Lauche. Oberdieck, n°315, 1865, Illustrirte. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.