


REINETTE GRISE D'AUTOMNE (Automne-Hiver)-G-

©Fichier choisel jean-louis-2001-2013


ORIGINE : D'après A.Leroy(silhouette ici à droite), ce serait la Hollande avant 1690.Encore vendue en 1916 dans les pépinières Leroy d'Angers.

Graawe Renet(mat.12/01), Reinette Grise d'automne selon Van Noort, 1830, Pomologia Batavia.

SYNONYMES : Reinette Grise d'Angleterre (dom Claude Saint-Etienne « Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits », 1670, p.216.- et Diel, « Kernobstsorten », 1800, t2, p.94.- et Vorz « Kernobstsorten », 1826, t.4, p.91).- Grosse Reinette Grise Plate(Merlet « L'Abrégé des bons fruits », 1690, p.133).- Graue Herbst Reinette(Mas « Le Verger », t.2, 1868, n°18, gravure ici à gauche- et W.Lauche, 1882/83, « Deutsche Pomologie », n°87).- Graue Herbst Reinette(Heidemij « De Nederlandsche Boomguard », n°96, pl.49, gravure du milieu ici, 1868,Hollande).- Ne pas confondre avec Reinette Grise, ni avec Reinette Jaune Hâtive appelée Reinette Grise d'Automne en Angleterre.



W.Lauche Deutsche Pomologie 1880.



R.Stoll 1888 Pomologie.



Vue A.Mas Le Verger 1868.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-décembre-janvier. Type 2 moins conique que celle décrite par Oberdieck. De plus chez cet auteur les loges sont lisses.

FORME : Grosse, L=84mm., H=66mm.- Plus large, conique, toujours plate côté pédoncule, plus ou moins pentagone côté cuvette de l'œil. Pourtour irrégulier. Chez Oberdieck conique haute pouvant être aussi large que haut.

EPIDERME : Rugueux, tout bronzé (gris). Lenticelles grises et claires et grosses.(Leroy). Pour les Allemands et les Hollandais il n'est pas gris totalement.

CUVETTE du PEDONCULE : Vaste, fauve squameux.

PEDONCULE : Gros, très court, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, unie ou plissée, fauve squameux.

ŒIL : Grand, ouvert ou mi clos. Grandes sépales.

CHAIR : Blanc-verdâtre, fine, assez tendre, devenant vite molle, bien juteuse, sucrée, fortement et agréablement acidulée à parfum léger. Deuxième qualité.



LOGES à PEPINS : Mi lune, moyennes, feutrées, closes.
Ouvrtes et lisses chez Oberdieck, 1875 Illustrirtes, n°513.

Diel.

OBSERVATIONS : Les gravures de Heidemij ne correspondent pas à ces descriptions, celles de Mas , Lauche , Stoll sont plus proches.

Arbre de moyenne vigueur à rameaux très duveteux à lenticelles petites, arrondies, clairsemées. Yeux moyens, cotonneux, en partie collés à l'écorce et aux écailles mal fermées. Feuilles régulièrement dentelées, lisses, petites à moyennes, à court, gros et rigide pétiole.

REFERENCES : jean-louis Choisel © 2001-2007. Et photos J.C.Grandjean 2007.

BIBLIOGRAPHIE :J.Vercier, 1934, p.218. Lauche. A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°408.- Van Noort 1830. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche. A.Mas+A.Lefèvre, Le Verger, 1868.