

REINETTE GRISE DE SAINTONGE

Fichier Choisel ©1984-2001






Photo couleur trois pommes=Choisel, Verger Barbier arbre Jahan fournisseur. Les 2 types selon Leroy(coupes Choisel). A Rozier



" Les Meilleurs fruits au début du XXe siècle 1900

- Tricaud.-

ORIGINE : Très ancienne et française. Importée en Amérique en 1636. Le Hollandais Knoop la décrit sous le synonyme de Geele Gulderling (Gulling), p.10, 1740- et p.40, 1766. Il y a dans "Annales de pomologie belge et étrangère" réédition 1998, p.497, pl. p.495, mais publiées de 1853 à 1860, une Reinette Grise=Grauve Franse Renett de Knoop=Reinette Grise Française de Diel=Haute Bonté de Noisette. Bien que Leroy nomme notre pomme Haute Bonté, n°213, il ne signale pas "Annales....." en référence, en 1873. Il a donc estimé que ce sont deux variétés différentes. Encore vendue chez Leroy d'Angers en 1916 et 1935. Protégée à Brogdale (the Book of apples", 1993; p.252). Dans "Les Meilleurs Fruits du XXe siècle ", 1900, Sté Nationale d'Horticulture de France nous lisons : Cultivée depuis plusieurs siècles dans l'ouest de la France et notamment dans les Charentes, p.512, 513.



Larousse Agricole 1922.

SYNONYMES : Blandilalié (au XIII^e siècle, Roquefort "Glossaire de la langue romane", 1808, t.I, p.158).- (La Quintinye "Instruction pour les jardins fruitiers et potagers", 1690, t.I, p.393).- Haute-Bonté (Miller "Dictionnaire des jardiniers", 1724, t.4, p.530).- Geele Gulderling (Gulling) (Herman Knoop "Pomologie", 1771, p.40; et Henri Manger "Systematische Pomologie", 1780, t.1, p.70, n° 136, et p.74, n°150).- De Saintonge (Comice horticole d'Angers, 1838, "Catalogue de son jardin fruitier", n°228).- Reinette Grise Haute-Bonté (Congrès pomologique de la France, 1867, t.4, n°23).- Reinette de Saintonge (d°).- Reinette Grise de saintonge (d°).- Haute-Bonté (Dictionnaire de Pomologie, 1873, A.Leroy, Angers, n°213).- Pomme d'Enfert probablement à tort.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Avril.

FORME : Moyenne à plus. Deux types= sphéroïdal et conique. Un peu pentagone. Le type sphéroïdal est comprimé aux pôles. Type conique=L=78mm., H=61mm. (conique pour celles de R. Jahan)- Type sphéroïdal=L=77mm., H=71mm.

EPIDERME : Rugueux, tout bronzé ou vert blanchâtre nuancé de jaune et de gris (gris=Tricaud). Lenticelles brunes. Roux olivâtre autour du pédoncule. Parfois, rarement, un peu teinté ou panaché de rouge sombre cuivré à l'insolation. (Les Meilleurs Fruits...=Mince, rude, d'un vert blanchâtre, recouvert de gris ou complètement bronzé, ponctué de brun, quelquefois lavé de rouge à l'insolation).

CUVETTE du PEDONCULE : Bien développée (choisel= profonde et moyenne largeur).

PEDONCULE : Gros, renflé à l'attache, court ne dépassant pas ou dépassant du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu ou moyen-profonde, largeur moyenne ou plus (25 à 30mm. chez Leroy). Bords inégaux (Leroy et Tricaud), plissée (Vercier), normale (V.F), variable (choisel).

ŒIL : Grand à petit ouvert à clos.

CHAIR : Jaunâtre,(avec filets verts chez celles de Jahan)(jaune verdâtre=Les Meilleurs Fruits..) fine, ferme, croquante, juteuse, à peine acidulée(peu acidulée=Les Meilleurs Fruits...), un peu anisée, sucrée. Première qualité.

LOGES à PEPINS : Plus hautes, non feutrées(feutrées chez celles de Jahan), closes. Rapport H/L=13/8=1,6

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux (Moyen=Les Meilleurs Fruits...)à rameaux érigés, un peu cotonneux, rouge-brun ardoisé, à petites et nombreuses lenticelles arrondies. Yeux gros à moyens, très duveteux, presque tout collés à l'écorce et, parfois formant éperon à la base des rameaux. Feuilles petites, ovales, faiblement crénelées à pétiole moyen, raide.

REFERENCES : André Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°213.-Choisel, étude, coupes, photos et ouvrage "J'Identifie mes pommes anciennes"1980-84.-©

BIBLIOGRAPHIE :Décrite aussi par J.Vercier, 1934, p.307 -Le Verger Français, 1947, T.1, p.411- P.Tricaud, 1938, "Le pommier et le poirier en Limousin"p.104, 105- P.F. L'évêque, 1946, "Pommiers à couteau de plein vent", p.85=un cliché N.B. pas très visible, absent ici, et seulement "Fruit moyen, gris ou bronzé. Maturité: fin décembre-début mars. Arbre vigoureux, érigé, également apte aux petites formes".