

REINETTE HARBERT



© 2001-2013 fichier choisel.

ORIGINE : Allemagne, en Westphalie. Envoyée au docteur Diel, premier descripteur ("Vorz. Kernobstsorten", 1828, t.5, p.44) par Harbert, pomologue à Arnsberg, Westphalie. Cultivée par A;Leroy, Angers, depuis 1861.


Présente à Brogdale ("the Book of Apples", 1993, p.217). Décrite aussi par W.Lauche, "Deutsche Pomologie", 1882/83, n°37.

SYNONYMES : Harbert's Reinette(Diel).- Harbert's Reinettartiger Rambour (d°).- Reinette Herberg, par déformation. Harbert.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mars.



Deutsche Pomologie, W.Lauche, Berlin, 1880 et 1882.



Stoll 1888 Autriche, Pomologie.

FORME : Bien grosse, L=80mm., H=63mm.- Plus large, conique-basse, sommet côtelé.

EPIDERME : Mince, un peu onctueux, jaune d'or, nuancé ou moucheté de rose tendre à l'insolation. Eventuelles traces fauves. Lenticelles nombreuses, gris verdâtre.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde, roux squameux.

PEDONCULE : Moyen en tout, arqué, dépasse le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large (30mm.), Très profonde, côtelée(ou gibbeuse).

ŒIL : Grand, mi clos ou clos, à longs sépales.

CHAIR : Jaunâtre, mi fine, assez tendre, juteuse à bien juteuse, sucrée, très acidulée, presque sans parfum. Deuxième qualité.



LOGES : Bien ouvertes, lisses à feutrées.

Choisel 2008 selon Oberdieck.

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux à nombreux, gros, duveteux rameaux étalés à lenticelles assez grandes, clairsemées mais très visibles. Yeux petits, coniques, cotonneux, collés à l'écorce. Feuilles grandes, régulièrement dentelées, à pétiole très gros, long, profondément cannelé. Fertilité normale.

REFERENCE :Fichier Choisel j.l.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°412 (silhouette ici). Oberdieck, 1865,n°344, Illustrirtes.

Deux pommes et coupe, couleurs de Heidemij, Hollande, 1868, "de nederlandsche Boomgaard", pl.50, p.35, n°99.W. Lauche 1880, Deutsche Pomologie.Rudolf Stoll 1888 Pomologie.