


REINETTE JAUNE HATIVE (Eté-Automne)

Fichier choisel jean-louis. 2000-2013



©2004.Selon Leroy.

selon Diel 1833 : et



R.Stoll 1888 Pomologie.

ORIGINE : Française, avant 1628. C'est Duhamel qui la décrit sous son nom actuel en 1768 « Traité des arbres fruitiers.. », t.1, p.294. Existe aussi dans le 4^e volume, 1846, n°39, de Poiteau.

SYNONYMES : Reinette Prime(Le Lectier « Catalogue des arbres cultivés dans son verger... », 1628, p.22.- et dom Claude Saint-Etienne « Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits », p.215).- Reinette Hâtive(d^o, et Bonnefond « le jardinier français », 1653, p.107).- Reinette Blanche(d^o dom St. Etienne et Merlet « l'Abrégé des bons fruits, 1667, p.147).- Reinette Jaune d'Automne(La Rivière et du Moulin « Méthode pour bien cultiver les arbres à fruits », 1738, p.264).- Petite Reinette Jaune Hâtive(Manger, « Systematische

Pomologie », 1780, 1^e partie, p.24, n°7).- Reinette d'Eté(d°) .- Reinette Dorée d'Eté(Diel, « Kernobstsorten », 1806, t.8, p.97).- Citron des Carmes(Thompson « Catalogue of fruits cultiv. In the garden hortic. Society of London », 1842, p.36, n°672).- Reinette Marbrée(d°).- Rambouillet(baron de Flotow « Illustriertes Handbuch der Obstkunde », 1859, t.1, p.271, n°120).- Goldegelbe sommer reinette (1875 Lucas et Oberdiek.

Note : Ne pas confondre avec REINETTE JAUNE D'ETE décrite par Jaume Saint Hilaire(La Flore et la Pomone Française, Paris chez l'auteur rue Furstemberg, 6 tomes ,1828/1833). Cette pomme(T4,1831,pl.369) ressemble presque en tous points à la présente mais il y a moins de lenticelles sur l'épiderme , la cuvette de l'œil est mamelonnée et la chair devient vite farineuse.

MATURITE-CONSOMMATION : Fin septembre-Novembre, et même fin décembre si on récolte les fruits avant complète maturité et qu'on les conserve en lieu bien frais.

FORME : volumineuse ou moyenne, Type1=L=61mm., H=67mm., cylindrique- Type 2=L=80mm., H=75mm., conique.- Pour Diel : sphéroïdale.

EPIDERME : Unicolore, jaune blanchâtre. Lenticelles grisâtres larges et nombreuses. Traces fauves (Diel).

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite et profonde, fauve.

PEDONCULE : Gros et court, ou moins gros et plus long, dépasse ou non du sommet, droit ou arqué, plus gros à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large, très profonde, ondulée sur les bords.

ŒIL : Grand, mi clos.

CHAIR : Blanche, mi fine , tendre et croquante, devient pâteuse, juteuse, sucrée, vineuse, faiblement acidulée et parfumée. Deuxième qualité.

LOGES :Closes, hautes, lisses.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à rameaux duveteux, et à lenticelles grandes, nombreuses. Yeux petits, arrondis et plats, très collés à l'écorce. Feuilles grandes, assez profondément dentelées et sur-dentelées, à pétiole gros, très court.

REFERENCES : choisel jean-louis

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy,1873, Dictionnaire de Pomologie, Angers,t.4, n°413.(texte et vues ici).Pastels choisel Jean-louis2004©. Diel Kernobstsorten 1833, pl.38. Illustriertes Lucas et Oberdiek 1875 n°120 p.271. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.