

REINETTE MUSQUEE

©2002-2006-2007-2013-fichier choisel.


ORIGINE : Normandie , avant 1600 . Etait cultivée dans l'Eure , la Manche , l'Orne . De là elle parti en Angleterre , vers 1750(ou elle fut baptisée Margil) , Hollande , Allemagne , Amérique.

Encore produite par les pépinières Leroy d'Angers après 1919 et chez Nomblot-Bruneau , de Bourg-la-Reine(92) dans les années 1930. Décrite par l'allemand W.Lauche en 1880 puis 1882, Berlin, Deutsche Pomologie.

Conservée à Brogdale (the book of apples , 1993 , p.233).

Ne pas confondre avec Reinette Musquée Grise signalée par le hollandais Knoop dès 1740, comparée à tort par l'allemand Meyer en 1776/1801 , ni avec Jennette et Raule's Janet synonymes confondus avec le surnom Never Fail donné par les américains à Rawle's Janet , autre variété.

NOTE : Il existait une Reinette Musquée à épiderme jaune : Muskirte Gelbe Reinette mure en hiver(Illustirten, Lucas,n°151, 1855).



Deutsche Pomologie, 1880, W.Lauche.



Apples of New York-1905-SA BEACH. Merci Alain Rouèche.



R.Stoll 1888 Pomologie en Autriche.



Pomona Londinensis William HOOKER 1818,V1.

SYNONYMES : Muscate(Olivier de Serres , 1608) - Musquée(dom Claude St Etienne , 1670) - Reinette Douce et Jaune(H.Knoop , 1760 et 1771) - Reinette d'Hiver Sucrée(d°, 1780) - Muscadet(marquis de Chambray , 1765) - Sucrée d'Hiver(Mayer ,allemand , 1776)- Reinette Douce de France , Manger , allemand , 1776) - Reinette Douce Musquée(d°) - Muscateller reinette(Sickler , allemand , 1799) - Margil(Hooker , Londres , 1813) - Munche's Pippin(Thompson, Londres , 1842 et Lucas , allemand , 1859) - Small Ribston(Lucas) - Never Fail(Thompson et Lucas) - Fail Me Never(Charles Downing , américain , 1869) - Muscat Reinette(Lauche , 1882/83). Muscat Reinette, Muscaten Reinette.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février-mars pour Leroy (et Octobre-Décembre pour Brogdale en 1993, à tort)

FORME : Moyenne , L=69mm , H=67mm- Plus large , conique(arrondie) presque sphérique ; asymétrique ; pourtour irrégulier.

EPIDERME : Un peu rugueux , jaune grisâtre ou brunâtre côté ombre , jaune d'or côté insolation ou il y a un fort lavis rouge-brun clair et fouetté(stries) de carmin . Une large tache

fauve et squameuse s'étend au delà du sommet partant de la cuvette du pédoncule . Lenticelles rousses , jaunes , grisâtres côté ombre peu nombreuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite , profonde , fauve squameux très étendu.

PEDONCULE : Fin ou moyen , court ou moyen , ne dépasse pas , en principe , sauf chez Hedemij.

CUVETTE de L'ŒIL : Petites dimensions , plissée , bossuée , peu être des traces fauves.

L'ŒIL : Petit , clos ou mi clos.

CHAIR : Jaunâtre ou verdâtre, mi fine , assez ferme , juteuse , aucune acidulité donc douce , très sucrée , saveur anisée musquée. Peut être utilisée pour le cidre.

LOGES à PEPINS : Mi lune, un peu feutrées ou lisses , à peine irrégulière ,



closes.

OBSERVATIONS : Bois assez faible à nombreuses et très petites lenticelles allongées. Feuilles très petites finement crénelées , à très long pétiole fin et à cannelure visible . Gros yeux non collés à l'écorce . Arbre très fertile

REFERENCES : Choisel jean-louis.

BIBLIOGRAPHIE : Vercier 1934 , p.266 - Mas , Le Verger , 1868 , t.4 , n°88 - W.Lauche , Deutsche pomologie , 1880 et 1882 , n°39. A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°425 , silhouettes ici - Heidemij , 1868 , De Nederlandsche Boomgaard , n°62 : gravure couleur. Apples of New York-1905-SA BEACH. Merci Alain Rouèche. Diel 1833, pl.4 Kernobstsorten. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en autriche. Et voir texte