



REINETTE GRISE PARMENTIER (01.03)-G-

ORIGINE : Obtenue par Parmentier à Enghien, Belgique. Premier rapport vers 1833.

SYNONYMES : Grise de Parmentier- Reinette Grise d'Hiver.- Reinette Grise Vaudoise(en



Suisse).- Reinette Parmentier, Reinette grise Parmentier.



H.Kessler,Pomologie Illustré, 1949.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mars. Se ride facilement, à conserver en local humide.

FORME : Moyen ou plus, L=65mm., H=55mm.ou L=70mm., H=65mm.- Plus large, sphéroïdale déprimée ou conique léger. Pourtour modifié par de légères côtes.

EPIDERME : Rude, sec, jaune vert à jaune citrin, qui n'est souvent visible que dans la cuvette de l'œil car le fruit est tout couvert de rouille brune(Kessler), de fauve(Vercier et V.F.), avec ou sans squames. Parfois , côté insolé, il y a quelques taches rouge cuivre, environnées de rouille argenté luisant(0 à ¼)(Kessler). Lenticelles peu évidentes, petites, gris brun.

CUVETTE DU PEDONCULE :Large, évasée, profonde, rouille à écailles gris-brun.

PEDONCULE :Moyen à gros, (plus à l'attache), dépasse un peu du sommet, brun-rouge, avec quelques éperons(Kessler).

CUVETTE DE L'ŒIL : Largeur et profondeur moyennes, parfois profonde, partiellement rouillée, un peu de jaune vert ou citrin, un peu plissée ou un peu côtelée.

ŒIL : Moyen, clos à sépales bien laineux et longs, érigés en bouquet.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, faisceaux libéro-ligneux verts, fine, mi ferme à tendre, juteuse, assez acidulée mais le sucrée la rend savoureuse (saveur de Reinette= Le V.F.).

LOGES à PEPINS : Hautes, assez feutrées.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux, lenticelles sur rameaux grosses, saillantes, rares. Floraison mi tardive.

REFERENCES : Sté Pomologique de France « Catalogue descriptif », 1927, p.429(silhouette ici).-

BIBLIOGRAPHIE : Kessler « Pomologie Illustrée », 1949, Suisse.p.44, 45.- « Le Verger-Français », t.1, 1947, p.422