


# RIBSTON PIPPIN

Fichier choisel 2000-2013




Le Verger.19° siècle

Ici : selon Leroy et SNHF.



Apples of New York, 1905.



Diel 1833 pl.10 Kernobstsorten. et R.Stoll 1888 Pomologie.




Pomona Londinensis Hooker William 1818 V.1

**ORIGINE :** Première version selon A.Leroy : Des pépins récoltés à Rouen vers 1886 furent semés dans le jardin du château de Ribston près de Knaresborough , dans le comté d'York. Première description en 1805.

Deuxième version selon Brogdale (the book of apples , 1993 ; p.253) : Apportés de Rouen par sir Henry Goodricke à Ribston , vers 1707 ,et introduit dans le reste de l'europe vers 1800.

Encore vendue en 1935 dans les pépinières Leroy d'Angers et Pinguet-Guindon de Tours.



W.Lauche Deutsche Pomologie 1880.

**SYNONYMES :** Pépin Ribston(Forsyth , 1805 , angleterre)- Ribstone(Van Mons, Belgique , 1823)- Formosa Pippin(Lindley, 1831, angl.)- Glory of York(d°)- Traver's(d°)- Rockhill's Russet(CH. Downing , américaine , 1863)- Reinette de Traver(Mas,Le Verger , 1868 , n°48)- Ribston Pepping.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Mars.

**FORME :** Volumineuse. Il existe deux types: Plus large, conique (vue couleur ici), L=79mm, H=71mm- Plus large , plus cylindrique(pastel), L=80mm , H=74mm.- Pourtour un peu côtelé côté cuvette de l'œil.

**EPIDERME :** Les dessinateurs ont tendance à donner des tons oranges.

Mi rugueuse ou lisse, jaune or(et pas orange, comme chez certains anciens auteurs) , lavé et fouetté(stries) de rouge terne(et pas orange, selon certains) à l'insolation. Un peu marbré de fauve. Lenticelles grises peu évidentes.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite, profonde , fauve.

**PEDONCULE :** Court ou moyen, grosseur moyenne. Souvent ne dépasse pas(à 90%).

**CUVETTE de L'ŒIL :** Large, surtout pour le type cylindrique(30mm), profonde, côtelée , peut être tachée de fauve ou gris.

**L'ŒIL :** Grand à moyen , clos ou mi clos.

**CHAIR :** Jaunâtre(blanc lacté probablement à tort: Annales de pomologie....) , fine , serrée , ferme , bien juteuse ou normal , bien sucrée , acidulée , goûteuse. Première qualité.

**LOGES à PEPINS :** Un peu feutrées ou fendillées, en goutte d'eau, closes, pointues vers le



pédoncule.

Diel.

Pour l'autrichien Stoll, Pomologie, 1847 elles sont lisses.

**OBSERVATIONS :** Lenticelles sur rameaux grandes , nombreuses.

**REFERENCES :** Choisel Jean-Louis, recherches .

**BIBLIOGRAPHIE :** Heidemij , De Nederlandsche Boomgaard, 1868 , hollandaise , n°3 pl.2.-  
Les Meilleurs fruits au début du XX<sup>e</sup> siècle , 1907 , p.516(pl.ici) et 517- Annales de  
Pomologie belge et étrangère , réédition 1998 , pl.287 et p.288 -W.Lauche , Deutsche  
Pomologie . Vue tout en haut gauche :Mas. Apples of New York, 1905, Sa Beach, merci Alain Rouèche pour  
les vues. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche. Et voir texte.