



ROSE DE SAINT FLORIAN (Eté-Automne)-R- +H

©2001-2008-Fichier choisel

ORIGINE : Allemagne, avant 1776.Cultivée à Angers, chez Leroy, fin du 19^e siècle.

SYNONYMES : Passe –Rose(Mayer « Pomona franconica », 1776, t.III, p.163, n°63).- Rose d'Automne (d°).- Rose d'Eté (d°).- Rosette Marbrée (d°).- Rosette d'Eté Marbrée (Manger « Systematische Pomologie, 1780, 1^e partie, p.40, n°LIV).- Florianer Rosen (Oberdieck « Illustriertes Handbuch der Obstkundd », 1859, t.1, p.431, n°199).- Gestreifter Rosen(d°).- Florianer Rosenapfel (Hedemij, 1868, « De Nederlansche Boomguard », n°67, pl.35, gravure ici).- Rosenapfel Florianer (d°).- Roseau d'Automne (Charles Downing « the Fruits and fruit trees of America », 1869, p.82, à confirmer).-

Ne pas confondre avec Pépin de Saint Florian=Florianer Pepping (Allemagne).

MATURITE-CONSOMMATION : Septembre-Octobre.(Vercier=Novembre-Mi décembre).A Brogdale, réf.7LD, =octobre-janvier(page 208 de « the Book of Apples, 1993, J.Morgan et A.Richards).

FORME : Moyenne à plus, Type1=L=63mm., H=72mm., Type2=L=50mm., H=58mm.- Plus haute, conique ou ovoïde allongée, côtelée côté œil.

EPIDERME : Lisse, mi mince, résistant, jaune pâle à l'ombre, jaune saumoné côté insolation et amplement, quoique légèrement, lavée de rose, et marbrée de carmin foncé et strié. Nombreuses mais fines lenticelles gris-blanc.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, plus ou moins profonde.

PEDONCULE : Arqué, court(ne dépasse pas), ou assez long, dépasse du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu développée, fortement bossuée sur ses bords.

ŒIL : Grand ou moyen, clos ou mi clos, cotonneux.

CHAIR : Blanche, veinée de vert près des loges(Vercier=Blanchâtre), un peu rosée sous la peau, tendre, fine, assez croquante, très juteuse (Vercier=peu à mi juteuse), bien sucrée, peu acidulée, saveur exquise particulière. Première qualité.



LOGES A PEPINS :Larges, mi ouvertes à ouvertes, assez feutrées

Diel.

OBSERVATIONS : Arbre de vigueur moyenne, à rameaux très cotonneux, à petites lenticelles éparses. Yeux moyens, arrondis, duveteux, en partie collés à l'écorce. Feuilles régulièrement dentelées, à pétiole grêle et de longueur moyenne.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, « Dictionnaire de Pomologie », t.4, 1873, n°463.(silhouettes ici).- Heidemij, voir plus haut, (gravure couleurs ici).-

BIBLIOGRAPHIE:J.Vercier, 1934,p.218