

## SAINT-JACQUES

(Eté) Fichier,étude,photos,coupes=Choisel J.L.(Reproduction interdite)©1991-2001

ORIGINE: Dordogne. Trouvée à Picarette, St. Jean de Cole-24800, Thiviers.

SYNONYME: Ne pas confondre avec le synonyme St. Jacques donné à Passe Pomme d'Eté.

MATURITE. CONSOMMATION: Mi Août.

TYPE:

FORME: Moyenne à plus gros, plus large, discoidale-plate. L. 82mm., H. 61mm. environ. A peine asymétrique. Pourtour irrégulier à petites côtes.

EPIDERME: Lisse. blanchâtre, bien strié d'un beau rouge, à peine fouetté d'un rouge moins vif. Pas de lenticelles.


CUVETTE du PEDONCULE: Très large, évasée, profonde, gris-vert débordant du sommet.

PEDONCULE: Diamètre plus que moyen, court. Parfois le diamètre est mince.

CUVETTE de L'ŒIL: Large en cupule, profonde, un peu plissée avec quelques côtes au sommet, parfois.

ŒIL: Diamètre moyen à plus, ouvert.

CHAIR: Blanche, sucrée, acidulée, parfumée.



LOGES à PEPINS: Non feutrées, assez arrondies-larges.

OBSERVATIONS:

REFERENCES: Choisel Jean-Louis.(ses premières observations réalisées en 1957/58 dans les environs de Saint-Astier en Dordogne).