


STRAWN

FICHER Choisel 2000-2012



©2012 fichier choisel

ORIGINE : Semis de James Strawn , Virginie , 1850 , Amérique. Diffusée par A.Leroy d'Angers à partir de 1873.

SYNONYMES : Strawn's Seedling (Charles Downing , the Fruits and fruit trees of America , 1869 , p.362).

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai.

FORME : Petite , L=50mm , H=47mm. - Plus large , sphéroïdale , régulière.

EPIDERME : Lisse , onctueux , jaune à peine verdâtre , amplement strié et réticulé de rose terne , surtout à l'insolation . Lenticelles très fines , nombreuses , grises.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite de moyenne profondeur .

PEDONCULE : Fin , long , dépasse le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu développée.

L'ŒIL : Moyen , ouvert ou mi clos.

CHAIR : Jaunâtre , compacte , fine , ferme , juteuse , acidulée , plus ou moins sucrée , assez savoureuse.

LOGES à PEPINS :

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois petites , rapprochées , blanches.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°496 .

1.