



TAUNTON

© choisel j.l.-2001

ORIGINE : Sud de l'Amérique du nord, soit la Géorgie, soit l'Alabama, selon Downing, 1869, p.380. A.Leroy d'Angers la cultivait dès 1858.

J'ai pu identifier cette variété chez R.Barbier de Loches et en prendre des clichés ici..
Correspond en tous points avec la description de Leroy qui avait une pépinière en Touraine.

SYNONYMES : Ne pas confondre avec Taunton Golden Pippin des anglais et des américains qui est plus tardive(12-04). Ni avec Taunton Cross croisement de Wealthy des anglais vers 1919, conservé à Brogdale(p.264,the Book of Apples, 1993).

:

MATURITE-CONSOMMATION :Octobre-Janvier.

FORME : Grosse.Deux types.Un sphéroïdal : L=80mm., H=65mm.- Un peu conique :L=83mm., H=70mm..- Plus large, asymétrique .pentagone.

EPIDERME :Mince, lisse, jaunâtre, presque tout lavé de rouge-brun clair, bien strié de carmin vif. Lenticelles brun grisâtre.(cendrées, anguleuses, petites à moyennes, nombreuses).

CUVETTE du PEDONCULE :Etroite à moyenne, profonde, roux verdâtre.

PEDONCULE : Gros, moyen ou long , ne dépasse pas du sommet sinon à peine.(2mm.).

CUVETTE de L'ŒIL : Peu vaste, bosselée, plissée. Parfois traces fauves.

ŒIL : Grand ou moyen, clos ou mi clos.

CHAIR :Jaunâtre, fine, tendre à ferme, bien juteuse, délicieusement acidulée-sucrée à mi acidulée-mi-sucrée, arôme délicat. Première qualité

LOGES à PEPINS: Moyennes, lisses, closes.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à rameaux duveteux ayant des lenticelles peu nombreuses, grandes ou moyennes. Yeux assez gros, cotonneux , peu collés à l'écorce Feuilles très grandes, profondément dentelées, à très long gros et flasque pétiole.

REFERENCES : André Leroy, Angers, « Dictionnaire de pomologie », 1873, n°508.(silhouette ici). Photo choisel ©2001.